



Covid19-Rheuma.de

Daten der Impfumfrage

Stand 01.11.2021

COVID-19-Impfung & Rheuma

Liebe Patientinnen und Patienten,

Sie leiden an Rheuma & sind bereits geimpft?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen zur COVID-19-Impfung mit uns und helfen Sie uns, weitere Erkenntnisse aus der Pandemie zu gewinnen. Wir begleiten Sie über einen Zeitraum von ca. 12 bis 24 Wochen (abhängig vom Impfstoff) mit kurzen Umfragen. Eine letzte Umfrage folgt nach 12 Monaten.


Zur Umfrage gelangen Sie über den QR-Code oder den Link:

<https://www.covid19-rheuma.de/patienten-information-impfung>




Bis zum 01.11.2021 haben 2143 Personen teilgenommen


Altersverteilung




Geschlechter



Bundesländer




Diagnose der Erkrankung (n=2143)




*Mehrfachauswahl möglich

Antirheumatische Medikation (n=2143)



*Mehrfachauswahl möglich

Impfstoffe bei Erstimpfung (n=2143)



Nebenwirkungen & Rheumaschub nach 1. Impfung

Nebenwirkungen nach COVID-19-Impfung		
Schmerzen an Einstichstelle	1493	70%
Müdigkeit	902	42%
Kopfschmerzen	668	31%
Gelenkschmerzen	505	24%
Schüttelfrost	311	15%
Andere	286	13%
Übelkeit	214	10%
Fieber	166	8%
Bauchschmerzen	62	3%
Allergische Reaktion	29	1%
Keine	288	16%
Schwerwiegende Nebenwirkungen		
Ponsinfarkt (RA ohne Immunmodulation)	1	
Thrombose	3	
Herpes zoster	2	

Zunahme Entzündungsaktivität nach COVID-19-Impfung	329	15%
Stärke des Schubes	5	0-10



Änderung der Immunmodulation aufgrund des Schubes (n=329)		
Nein	149	45%
Gering (Einsatz von NSAR/ ≤ 5 mg Prednisolon/Tag)	84	26%
Mehr als 5 mg Prednisolon/Tag	58	18%
Neue Immunmodulation	21	6%
Neue Kombinationstherapie	17	5%