




Covid19-Rheuma.de

Daten der Impfumfrage


Stand 23.03.2022

Bis zum 23.03.2022 haben 3183 Personen teilgenommen


Altersverteilung




Geschlechter



Bundesländer




Diagnose der Erkrankung (n=3183)




*Mehrfachauswahl möglich

Antirheumatische Medikation (n=3183)



*Mehrfachauswahl möglich

Impfstoffe bei Erstimpfung (n=3183)



Nebenwirkungen & Rheumaschub nach 1. Impfung

Nebenwirkungen nach COVID-19-Impfung		
Schmerzen an Einstichstelle	2202	69%
Müdigkeit	1305	41%
Kopfschmerzen	1008	32%
Gelenkschmerzen	778	24%
Schüttelfrost	487	15%
Andere	438	14%
Übelkeit	307	10%
Fieber	255	8%
Bauchschmerzen	87	3%
Allergische Reaktion	46	1%
Keine relevanten Nebenwirkungen	506	16%
Schwerwiegende Nebenwirkungen		
Ponsinfarkt (RA ohne Immunmodulation)	1	
Thrombose	3	
Herpes zoster	3	
Periphere Neuritis mit Parese des linken Beins	1	
Akute eosinophile Ösophagitis	1	
Guillain-Barré-Syndrom-Reaktivierung	1	
Facialisparese	1	
Myokarditis	3	

Zunahme Entzündungsaktivität nach COVID-19-Impfung	504	16%
Stärke des Schubes	6	0-10



Änderung der Immunmodulation aufgrund des Schubes		
Nein	203	6%
Gering (Einsatz von NSAR/ ≤ 5 mg Prednisolon/Tag)	131	4%
Mehr als 5 mg Prednisolon/Tag	94	3%
Neue Immunmodulation	45	1%
Neue Kombinationstherapie	31	1%